

Part A

137 Q

1	ក្នុងចំណោមជម្ងឺខាងក្រោម តើជំងឺណាមួយដែលមិនបណ្តាលអោយកើតជំងឺក្រិនថ្លើម(cirrhose)?	
A	រលាកថ្លើមដោយប្រពន្ធនៃ immunité (L'hépatite –immune)	
B	រលាកថ្លើម B (L'hépatite virale B)	
C	រលាកថ្លើម A(L'hépatite virale A)	
D	រលាកថ្លើម C (L'hépatite virale C)	
E	រលាកថ្លើមដោយសារថ្នាំ(L'hépatite médicamenteuse)	
2	តើកត្តាណាមួយដែលមិននាំឲ្យកើតជំងឺពុកឆ្អឹង (ostéoporose) ?	
A	កង្វះកាល់ស្យូមក្នុងរបបចំណីអាហារកាបង្រ្កប់ calciumមិនគ្រប់គ្រាន់(Un apport de calcium faible)	
B	កង្វះ protéines ក្នុងរបបចំណីអាហារក្នុងពេលពេញវ័យ(Un apport de protéines bas pendant la vie adulte)	
C	ការទទួលទានស្រាច្រើនពេក (Une consommation élevée d'alcool)	
D	ការជក់បារីច្រើនពេក(Un tabagisme important)	
E	ការសំនៅស្ងៀមមួយកន្លែងមិនសូវធ្វើចលនា(un mode de vie sédentaire)	
3	តើនៅក្នុងជំងឺណាមួយ? ដែលមានវត្តមាន immunoglobuline monoclonaleនៅក្នុងសេរ៉ូម	
A	ការកើនឡើងនៃពូក clone de cellules de la lignée B	
B	វត្តមាន une maladie maligne ពិតប្រាកដ	
C	គេសង្កេតឃើញតែលើមនុស្សពេញវ័យ	
D	មិនបណ្តាលអោយកើតជាជម្ងឺ	
E	មានជាប្រចាំក្នុងករណីplasmocyte monoclonale maligne	
4	តើការឈឺចាប់ខ្លាំងនៅក្រោមផ្លូវដំនីខាងស្តាំ(l'hypochondre droit) រួមជាមួយការឡើងកំដៅ និងការចេញល្បឿងតិចតួចនៅ conjonctive បណ្តាលមកពីជំងឺណាមួយ:	

	A	មហារីកផ្នែកក្បាលលំពេង (tête du pancréas)	
	B	មហារីកថង់ទឹកប្រមាត់ (vésicule biliaire)	
	C	គ្រួសក្នុងបំពង់ទឹកប្រមាត់ (une lithiase cholédocienne)	
	D	គ្រួសក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់ (une lithiase vésiculaire)	
	E	មហារីកក្នុងបំពង់ទឹកប្រមាត់ផ្នែកខាងលើ(biliaire supérieur)	
5		តើជំងឺណាមួយដែលមិនឲ្យមានLe syndrome du canal carpien ?	
	A	រលាកសន្លាក់ប្រភេទ rhumatoïde (polyarthrite rhumatoïde)	
	B	ជម្ងឺរលាកសរសៃពួរនៃសាច់ដុំ fléchisseurs របស់ម្រាមដៃ (téno-synovite infectieuse des fléchisseurs des doigts)	
	C	រូសឆ្អឹងកដៃ(carpe)	
	D	ជម្ងឺ amylose	
	E	ជម្ងឺ Raynaud(maladie de Raynaud)	
6		តើត្រូវសុំការពិនិត្យអមគ្លីនិកណាមួយ(examen complémentaire) ក្នុងករណីរលាកបង្ហូរនោមស្រួចស្រាវ ដោយមេរោគ gonococcique ?	
	A	ធ្វើតេស្ត fixation du complément	
	B	ធ្វើតេស្តលើស្បែក (intra-dermo réaction) ជាមួយantigène spécifique	
	C	ពិនិត្យទឹកនោមភ្លាមៗដោយប្រើ coloration de Gram du produit de l'écoulement	
	D	ការចាក់ចំលងទៅលើសត្វពិសោធន៍: (inoculation à l'animal)	
	E	ពិនិត្យទឹកនោម (Examen cyto-bactériologique des urines)	
7		តើថ្នាំ anti-inflammatoires non-stéroïdiensលេបឬចាក់មានប្រយោជន៍ក្នុងជំងឺណាមួយ?	
	A	Le psoriasis	
	B	L'érysipèle	
	C	L'impétigo	
	D	La dermatite atopique	
	E	គ្មានចំឡើយណាមួយត្រឹមត្រូវ	
8		តើថ្នាំ benzodiazépines ហាមប្រើក្នុងករណីណាមួយ?	
	A	អ្នកញ្ជាណស្រាវុំវៃ (alcoolisme chronique)	

	B	ក្នុងករណីភ័យស្លន់ស្លោ (attaque de panique)	
	C	adénomes prostatiques	
	D	ជំងឺ la myasthénie	
	E	វិបត្តិចង្វាក់បេះដូង (troubles du rythme cardiaque)	
9	តើបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺណាមួយខាងក្រោមដែលបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺខ្សោយបេះដូង (insuffisance cardiaque) ញឹកញាប់ជាងគេ នៅប្រទេសឧស្សាហកម្ម ?		
	A	ជម្ងឺសន្ទះបេះដូង(valvulopathies)	
	B	ជម្ងឺបេះដូងបណ្តាលមកពីខ្វះឈាមចិញ្ចឹម(cardiopathies ischémiques)	
	C	ជម្ងឺបេះដូងបណ្តាលមកពីលើសឈាម(cardiopathies hypertensives)	
	D	ជម្ងឺបេះដូងពីកំណើត(cardiopathies congénitales)	
	E	ជម្ងឺបេះដូងសាច់ដុំបេះដូងមិនដឹងមូលហេតុ(cardiomyopathies idiopathiques)	
10	តើការពិនិត្យអមគ្លីនិកណាមួយបញ្ជាក់ពីរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺស្វាយដែលបានចេញ ៣ថ្ងៃមកហើយ?		
	A	TPHA VDRL	
	B	បណ្តុះមេរោគក្នុងឈាម (Hémocultures)	
	C	ការចាក់ចំលងទៅលើសត្វ:(inoculation à l'animal) នៃទឹករងៃជំងឺ sérosité du chancre	
	D	ការពិនិត្យរកមេរោគផ្ទាល់ដោយប្រើ microscope à fond noir នៃទឹក sérosité du chancre	
	E	Test d'immobilisation de Nelson	
11	មនុស្សម្នាក់មានរបួសតែបានចាក់ថ្នាំបង្ការតេតាណុសគ្រប់គ្រាន់ចុងក្រោយតិចជាង ៥ឆ្នាំមានលិខិតបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទៀត?		
	A	ចាក់សារជាតិ globulines antitétaniques d'origine humaine	
	B	ចាក់សារជាតិ anatoxine spécifique	
	C	ចាក់សារជាតិ globulines antitétaniques d'origine équine	
	D	ចាក់សារជាតិ globulines antitétaniques d'origine humaine et d'anatoxine spécifique	

	E	វិធានការទាំង៤ខាងលើមិនចាំបាច់ (Aucune des mesures citées ci-dessus)	
12		ការខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហម(anémie) ដោយការហូរឈាមរ៉ាំរ៉ៃជាធម្មតាបណ្តាលអោយកើត	
	A	Une anémie microcytaire hypochrome avec un chiffre de réticulocytes élevé	
	B	Une anémie microcytaire hypochrome avec un chiffre de réticulocytes faible	
	C	Une anémie normochrome normocytaire arégénérative	
	D	Une anémie normochrome normocytaire régénérative	
	E	Une anémie macrocytaire normochrome régénérative	
13		អត្រាស្លាប់នៃកុមារគឺ(Le taux de mortalité infantile est):	
	A	ចំនួនក្មេងអាយុតិចជាង១ខែស្លាប់ធៀបនឹងកំណើតរស់ 1000ករណី	
	B	ចំនួនក្មេងអាយុតិចជាង១ខែស្លាប់ ធៀបនឹងក្មេងអាយុតិចជាង ១ខែ 1000 ករណី	
	C	ចំនួនក្មេងអាយុតិចជាង១ឆ្នាំស្លាប់ ធៀបនឹងក្មេងអាយុតិចជាង ១ឆ្នាំ 1000 ករណី	
	D	ចំនួនក្មេងអាយុតិចជាង១ឆ្នាំស្លាប់ធៀបនឹងកំណើតរស់ 1000ករណី	
	E	ចំនួនក្មេងស្លាប់-កើតច្រើនជាងចំនួនក្មេងស្លាប់អាយុចន្លោះពី០-៧ថ្ងៃ	
14		ក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាខាងក្រោមនេះ មាន១ដែលមិនអាចរកឃើញក្នុងជម្ងឺ insuffisance aortique សុទ្ធ	
	A	Pouls capillaire	
	B	Pouls ample et bondissant	
	C	Pincement de la pression artérielle différentielle (សម្ពាធឈាមចុះទាបខ្លាំង)	
	D	Danse des artères (សសៃឈាមអាក់ទែរញ្ជ័រ)	
	E	Angine de poitrine	

15	ក្នុងចំណោមការវិភាគខាងក្រោម ចូរបង្ហាញណាមួយអាចបញ្ជាក់ពី un cancer thyroïde différencié មានលើអ្នកជម្ងឺដែលបានកាត់ក្រពេញ thyroïde ទាំងមូលចេញ:	
	A Thyroxine libre	
	B Antigène carcinoembryonnaire	
	C TSH	
	D Thyroglobuline	
	E Calcitonine	
16	ក្នុងចំណោមជម្ងឺផ្លូវនោមខាងក្រោម តើមួយណាជាមូលហេតុចំបងអោយកើតជម្ងឺ (pyélonéphrite aiguë) លើក្មេងស្រីតូចៗ (petite fille) ?	
	A Syndrome de jonction pyélo-urétérale	
	B Lithiase rénale	
	C Dysfonctionnement vésico-sphinctérien	
	D Urétéro hydronéphrose	
	E Reflux vésico-urétéral	
17	ក្នុងចំណោមសុំណើរខាងក្រោមទាក់ទងជាមួយជម្ងឺក្រិនទងស្លតរាំវៃ(BPCO) តើមួយណាត្រឹមត្រូវ?	
	A វាមានការប៉ះពាល់ 25 % នៃប្រជាជនទូទៅ	
	B ការភ្លៀតទងស្លតដែលស្តែងចេញមួយផ្នែកធំមិនត្រឡប់ក្រោយវិញ (irréversible)	
	C វាអាចនាំមុខគេធ្វើអោយប៉ះពាល់តំរងនោម(atteinte rénale) ក្នុងករណីខ្សោយ alpha1 antitrypsine	
	D ការព្យាបាលដោយត្រឹមត្រូវអាចធ្វើអោយមានតល្យភាពផ្លូវដង្ហើម(normaliser la fonction respiratoire)	
	E ការព្យាបាលដោយ les corticostéroïdes inhalés គឺជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតក្នុងការព្យាបាលដោយថ្នាំ	
18	ក្មេងជំទង់ម្នាក់ដើរបាក់ពៀច( boiterie d'esquive) តើអ្នកចូលចិត្តសុំការ ពិពិស្ត យអមគ្លីនិកណាមួយ ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថាជា épiphysiolyse?	
	A ពិនិត្យឈាម(Bilan biologique)	

	B	ពិនិត្យអេកូ(Echographie)	
	C	ពិនិត្យស្កាន(Scanner)	
	D	ថតឆ្អឹងត្រគាកចំពីមុខដោយកាំរស្មីអិច(Radiographie du bassin de face)	
	E	ថតឆ្អឹងចង្កេះពីចំហៀង(Radiographie des hanches de profil)	
19	តើសញ្ញាដំបូងនៃភាពពេញវ័យរបស់ក្មេងប្រុសគឺអ្វីមួយ?		
	A	ការកើនឡើងទំហំនៃលិង្គ(augmentation de la taille de la verge)	
	B	ការដុះពាមឃ្មៅក	
	C	ការដុះពាមលើថ្ងាសក្រោម(apparition d'une pilosité pubienne)	
	D	បែកសំឡេង(mue de la voix)	
	E	ការកើនឡើងនៃពងស្វាសទាំងពីរ(augmentation de volume des testicules)	
20	ការចាក់ថ្នាំបង្ការ tétanos តើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច?		
	A	ជាមួយនឹង une culture de germes atténués par la chaleur,	
	B	ជាមួយនឹង une suspension de spores tétaniques tuées,	
	C	ជាមួយនឹង des gammaglobulines humaines antitétaniques,	
	D	ជាមួយនឹង le sérum d'un animal protégé,	
	E	ជាមួយនឹង la toxine tétanique modifiée par formol, chaleur et vieillissement.	
21	ពួកកោសិកាដែលមានតួនាទីក្នុងយន្តការការពារ(ដោយប្រយោល) ប្រឆាំងនឹងពួក virus គឺចំឡើយណាៗ?		
	A	Fibroblastes	
	B	Cellules réticulaires	
	C	Cellules T	
	D	Cellules B	
	E	Cellules NK	
22	តើមានរយពេលប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការព្យាបាលថ្នាំរំលាយឈាមប្រភេទ acénocoumarol (Sintrom*) ១គ្រាប់ក្នុង១ថ្ងៃ ដែលត្រូវមើលឈាមដើម្បីបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាល		
	A	5 នាទី	

	B	120 នាទី	
	C	12 ម៉ោងបន្ទាប់ពីប្រើលើកទី១	
	D	36 ទៅ 48 ម៉ោងបន្ទាប់ពីប្រើលើកទី១	
	E	1 អាទិត្យបន្ទាប់ពីប្រើលើកទី១	
23	បណ្តាពោគសញ្ញាខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ហា allergie តែមាន១ដែលមិនទាក់ទងជាមួយយន្តការ hypersensibilité immédiate តើអ្វី ?		
	A	Asthme	
	B	Rhinite pollinique	
	C	L'oedème de Quincke	
	D	L'eczéma de contact	
	E	Le choc anaphylactique	
24	តើត្រូវលេបថ្នាំបំពេញកង្វះខាតជាតិដែក(carence martiale)រហូតដល់ពេលណា?		
	A	រយពេល ២ខែ(Pendant deux mois)	
	B	រហូតដល់បរិមាណhémoglobine មកធម្មតា	
	C	រហូតដល់បរិមាណដែកក្នុងឈាម(fer sérique) មកធម្មតា	
	D	រហូតដល់បរិមាណសារធាតុផ្ទុកដែកក្នុងឈាម(ferritine sérique)មកធម្មតា	
	E	រហូតដល់លេចចេញពោគសញ្ញាក្នុងផ្លូវវិលាយអាហារ	
25	ការពិនិត្យលើជង្គង់អ្នកជំងឺទើបរួសថ្មីៗ បង្ហាញថាមានchoc rotulienតើចម្លើយណាមួយត្រឹមត្រូវ:		
	A	បញ្ជាក់ថាមានវត្តមាន épanchement liquidien ក្នុងសន្លាក់	
	B	បញ្ជាក់ថាមានវត្តមាន saignemen ក្នុងសន្លាក់	
	C	បង្ខំអោយចាក់បូមសន្លាក់ដើម្បីពិនិត្យមើល (ponction articulaire exploratrice)	
	D	ពោគវិនិច្ឆ័យភាគច្រើនគឺជា luxation traumatique de la rotule spontanément réduite	
	E	បង្ខំអោយធ្វើ arthroscopie សន្លាក់ដើម្បីពិនិត្យមើល នាំអោយគិតខ្លាំងដល់ការភ្លាត់	
26	មានជំងឺរួមគ្នាគឺ pancytopenie និង splénomégalie អាចជួបក្នុងករណី		

	A	Aplasia médullaire idiopathique	
	B	Leucémie aiguë	
	C	Leucémie lymphoïde chronique stade A	
	D	Myélome multiple	
	E	Anémie réfractaire simple	
27	តើមូលហេតុដែលជួបញ្ជីកញ្ចប់ជាងគេនៃ trismus គឺមួយណាខាងក្រោម?		
	A	Le tétanos	
	B	L'ankylose temporo-mandibulaire	
	C	គ្រោះថ្នាក់បណ្តាលមកពីធ្មេញ sagesse inférieur (L'accident d'évolution d'une dent de sagesse inférieur)	
	D	សន្លាក់ស្បែករួមវិញ (cicatrices cutanées rétractiles)	
	E	L'ostéite mandibulaire	
28	គ្រោះថ្នាក់នៃការបញ្ចូលឈាម (accident transfusionnel) ដែលជួបញ្ជីកញ្ចប់ជាងគេ គឺ:		
	A	Le choc anaphylactique	
	B	L'hémochromatose	
	C	L'hémolyse intra-vasculaire aiguë	
	D	L'hémolyse extra-vasculaire retardée	
	E	Le syndrome frisson-hyperthermie	
29	តើពាក្យ oligoarthritis មានន័យដូចម្តេច?		
	A	Une arthrite d'une articulation	
	B	Une arthrite de 2 ou 3 articulations	
	C	Une arthrite proximale	
	D	Une arthrite distale	
	E	Une arthrite peu inflammatoire	
30	តើផ្នែកណានៃខ្លួនដែលជាទូទៅមិនដែលជួបការញ័រ (tremblement) ពេលសំរាក នៅស្ងៀមនៃអ្នកជំងឺ Parkinson?		
	A	ប្រអប់ជើង(Le pied).	
	B	បាតដៃ(La main).	



	C	ក្បាល(La tête).	
	D	បបូរមាត់(Les lèvres).	
	E	ដើមដៃ(L'avant-bras).	
31	កំន្លងផ្លូវរលាក(infection osseuse) ដែលកើតឡើងក្នុងកញ្ចប់ជាងគេលើក្មេងគឺ:		
	A	L'épiphyse des os longs	
	B	La métaphyse des os longs	
	C	La diaphyse des os longs	
	D	Les os tubulaires	
	E	Les os plats	
32	អ្នកសុំធ្វើ bilan d'hémostase ដើម្បីរកការកកឈាមក្នុងសរសៃឈាមទូទៅ (coagulation intravasculaire disséminée (CIVD)). ក្នុងបណ្តាលទូទៅខាងក្រោមនេះ តើមួយណាអាចអោយយើងដាច់ចោលការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមិនមែនជា CIVD?		
	A	Temps de Quick/taux de prothrombine : 40 %	
	B	Plaquettes : 80 000/mm3	
	C	Fibrinogène : 1,80 g/L	
	D	D-dimères : 350 ng/ml (valeur normale du laboratoire < 450 ng/ml)	
	E	Taux de facteur V : 50 %	
33	ក្នុងបណ្តាលទូទៅខាងក្រោមនេះ មាន១អាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យពិតប្រាកដជា hyperaldostéronisme primaire តើមួយណា ?		
	A	Hypokaliémie	
	B	Hyperkaliémie	
	C	Hypernatrémie	
	D	Aldostéronémie élevée freinable par charge en sel avec rénine haute	
	E	Aldostéronémie haute non freinable avec rénine basse	
34	ក្នុងសំណើដូចខាងក្រោមនេះ បញ្ជាក់ច្បាស់ថា កូនកើតមកមិនចម្លងជំងឺ toxoplasmose ពីម្តាយដែលមានជំងឺ toxoplasmose កំពុងមានផ្ទៃពោះ::		
	A	អវត្តមានសញ្ញាគ្លីនិក(absence de signes cliniques)	
	B	លទ្ធផលវិភាគគ្រាប់ឈាមធម្មតា(normalité de l'hémogramme)	

	C	អវត្តមានមេរោគ toxoplasmosis ពេលយកទៅបណ្តុះលើសុកសត្វកណ្តុរ	
	D	អវត្តមាន IgM ក្នុង sérum ក្មេង	
	E	ការរលុបបាត់ IgG នៅពេលតាមដាន sérologie	
35		ក្នុងបណ្តាជំងឺ(affections) ខាងក្រោមនេះ ចូរជ្រើសរើសជម្ងឺណាដែលទាក់ទងនឹង syndrome fonctionnel restrictif :	
	A	Pneumectomie	
	B	Asthme à dyspnée continue	
	C	Emphysème pan-lobulaire	
	D	Bronchite chronique obstructive	
	E	Emphysème centro-lobulaire	
36		តើការពិនិត្យអមគ្លីនិកណាត្រូវសុំដើម្បីបញ្ជាក់ជំងឺ sciatique មានប្រភពមកពី discal ដែលវិវត្តន៍តិចជាង ១៥ថ្ងៃ	
	A	Electrophorèse des protéines	
	B	Scanner rachidien	
	C	Scintigraphie osseuse	
	D	IRM	
	E	Radiographies du rachis lombosacré, face et profil	
37		តើចម្លើយណាមួយខាងក្រោមដែលសម្គាល់ syndrome de souffrance du nerf médian au canal carpien?	
	A	ស្វិតសាច់ដុំ(atrophie) 1er espace interosseux	
	B	Des dysesthésies នៃម្រាមដៃទី៣ដំបូង នៅពេលគោះចំ canal carpien	
	C	ឈឺខ្នងដៃរាលឡើងទៅផ្នែកខាងក្រោយដៃ	
	D	Une hypoesthésie ម្រាមដៃទី៤ និងទី៥ នៅពេលត្រជាក់	
	E	Une paralysie de l'extension des doigts(ម្រាមដៃ)	
38		តើរោគសញ្ញាណាមួយសម្គាល់ការពុលស្រួចស្រាល់(Le syndrome d'intoxication aiguë)ដោយពូក barbiturique?	
	A	De la somnolence	
	B	Une dyskinésie	
	C	Des hallucinations	

	D	Un myosis	
	E	Une tachycardie	
39	ក្នុងបណ្តាឈ្មោះ : vaccins ខាងក្រោមនេះមាន១ជាប្រភេទ vaccin vivant តើអ្វី?		
	A	Anti-méningococcique	
	B	Anti-rabique	
	C	Anti-coqueluche	
	D	B.C.G.	
	E	Anti-tétanos	
40	ក្នុងចំណោមសំណើរដូចតទៅនេះ ចូរអ្នកគូសយកដោយគិតថាជាការសន្លប់មានប្រភពពី métabolique :		
	A	Coma peu profond	
	B	Survenue brutale	
	C	Présence de myoclonies multifocales arythmiques	
	D	Anisocorie	
	E	Signe de Babinski unilatéral	
41	នៅពេលបញ្ចូលឈាមម្តងៗ ការតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅនឹងគ្រែអ្នកជំងឺត្រូវតែធ្វើ គឺដើម្បីចៀសវាង accidents d'incompatibilité dans :		
	A	Tous les systèmes publics	
	B	Le système rhésus	
	C	Le système ABO	
	D	Tous les systèmes privés	
	E	Les systèmes Kell et Duffy	
42	ការប្រើថ្នាំបន្តកំភ្នែកពួក corticoïdes ត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងករណី		
	A	វត្តមានហើមនៅ cornée	
	B	រហូតដល់លេចចេញសញ្ញា inflammation de la glande lacrymale	
	C	ក្នុងករណីមាន uvéite antérieure	
	D	ក្នុងករណីមាន kératite herpétique	
	E	ក្នុងករណីមាន décollement de rétine	
43	មានការអះអាងមួយមិនត្រឹមត្រូវទាក់ទងជាមួយរោគកមរមាស់(gale) តើអ្វី ?		

	A	មានរមាស់ជាទូទៅពេលយប់(Présence de prurit, surtout nocturne)	
	B	មានរមាស់នៅតាមផ្ទុត់ស្បែក(Présence de sillons fins sur la peau)	
	C	ចំលងតាមការប៉ះពាល់ផ្ទាល់(Contact direct)	
	D	ភ្នាក់ងារចំលងគឺពូកែចៃ(Pediculus capitis)	
	E	ព្យាបាលដោយ: AscabiolR (Benzoate de Benzyl)	
44	ក្នុងចំណោមជំងឺគ្រាប់ភ្នែក(oculaires) ដូចតទៅនេះ មាន១មិនដែលអោយឈឺគ្រាប់ភ្នែក(oculaires) សោះ តើអ្វី ?		
	A	Décollement de rétine	
	B	Kératite	
	C	Glaucome aigu	
	D	Iridocyclite	
	E	Panophtalmie	
45	Une acidose métabolique រួមផ្សំជាមួយ une hypokaliémie ត្រូវបានគេរកឃើញក្នុងពេលដែលមាន:		
	A	ខ្សោយតំរង់នោមស្រួចស្រាវ (Insuffisances rénales aiguës)	
	B	រោគរាគស្រួចស្រាវ (Diarrhées aiguës)	
	C	ក្អក (Vomissements)	
	D	ព្យាបាលដោយថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមពូក (Traitements par diurétiques thiazidiques)	
	E	បាត់បង់ជាតិទឹកក្រៅកោសិកា (Déshydratations extra-cellulaires)	
46	ក្នុងចំណោមជំងឺខាងក្រោមនេះ មាន១ មិនបណ្តាលអោយកើតជំងឺលើសឈាម (l'hypertension artérielle) ?		
	A	Dissection aortique	
	B	Rupture d'un anévrisme cérébral	
	C	Oedème aigu du poumon	
	D	Prolapsus valvulaire mitral (maladie de Barlow)	
	E	Insuffisance rénale	
47	មានមួយដែលមិនមែនជាផលរំខាន(effet indésirable)របស់ morphine		
	A	La dépression respiratoire	

	B	La vasodilatation	
	C	La constipation	
	D	Les nausées, vomissements	
	E	Le glaucome	
48	តើការពិនិត្យអមគ្លីនិកណាមួយដែលអាចឲ្យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃ syndrome du canal carpien?		
	A	Radiographie du rachis cervical	
	B	Capillaroscopie	
	C	Scintigraphie osseuse	
	D	Examen doppler artériel	
	E	Electromyographie	
49	មូលហេតុពីចំងាយ (cause de loin) ដូចញឹកញាប់ dysfonctionnement douloureux de l'articulation temporo-mandibulaire គឺ:		
	A	Un aplatissement du tubercule zygomatique	
	B	Un défaut de profondeur de la cavité glénoïde	
	C	Une altération de l'articulé dentaire	
	D	Une inclinaison anormale du col du condyle	
	E	Une hyper-laxité ligamentaire	
50	បណ្តា ការបញ្ជាក់លើ l'allopurinol (ZyloricR) មាន១ត្រឹមត្រូវ តើអ្វី ?		
	A	វាធ្វើអោយការបញ្ចេញ acide urique តាមទឹកនោមកើនឡើង	
	B	វារំលោច xanthine oxydase	
	C	វាអាចផ្សំជាមួយ colchicine	
	D	វាជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ដោយ crise de goutte	
	E	វារំលោច uricase	
51	L'ototoxicité គឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលបណ្តាលមកពីក្រុម antibiotiques. គឺអ្វី?		
	A	Pénicillines	
	B	Céphalosporines	
	C	Tétracyclines	
	D	Macrolides	

	E	Aminoglycosides	
52	Le syndrome de PANCOAST et TOBIAS ធ្វើអោយប៉ះពាល់:		
	A	នៅ cervelet	
	B	នៅ nerf phrénique	
	C	នៅ nerf récurrent gauche	
	D	នៅ plexus brachial	
	E	នៅ nerfs intercostaux	
53	លក្ខណរបស់ mégaloblastique ក្នុងការខ្វះឈាម(anémie) ផ្អែកលើការបកប្រែលទ្ធផលវិភាគដូចតទៅនេះ តើអ្វី ?		
	A	ការបញ្ជាក់ដោយ volume globulaire moyen	
	B	Examen microscopique des frottis sanguins	
	C	Examen microscopique des frottis médullaires	
	D	Coloration de Perls appliquée aux frottis médullaires	
	E	វាស់កំរិត vitamine B12 និង folates ក្នុងឈាម	
54	តើការប្រើ antithyroidiens de synthèseអាចឲ្យមានបញ្ហាមួយខាងក្រោម?		
	A	បែកឈាម (L'hémolyse)	
	B	ខ្សោយតំរងនោម(L'insuffisance rénale)	
	C	La polynévrite	
	D	L'agranulocytose	
	E	វិលមុខ(Les vertiges)	
55	ក្នុងចំណោមសំណើដូចតទៅនេះ គឺទាក់ទងនឹង effets des inhibiteurscalciques តែមាន១ដែលមិនត្រឹមត្រូវ តើអ្វី ?		
	A	Risque de rétention hydrosodée	
	B	Vasoconstriction cérébrale à l'origine de céphalées	
	C	Délai d'action de l'ordre de 30 minutes(៣០ នាទី)	
	D	Vasodilatation périphérique	
	E	Vasodilatation coronaire	
56	Une hyperéosinophilie sanguine ជាធម្មតាមានក្នុងជំងឺណាមួយ ?		
	A	Coqueluche	

	B	Asthme	
	C	Amibiase	
	D	Lamblase	
	E	Cytomégalo-virose	
57	វត្តមាន hémiplégie រួមជាមួយparalysie faciale globale controlatérale តើមានក្នុង ចម្លើយណាមួយ ?		
	A	lésion localisée de la capsule interne	
	B	lésion localisée pédonculaire	
	C	lésion localisée protubérantielle	
	D	lésion localisée bulbaire	
	E	lésion frontale	
58	បណ្តាជំងឺ(affections)ខាងក្រោមនេះ តើជំងឺណាមួយហាមប្រើពួកថ្នាំ benzodiazépines ?		
	A	L'épilepsie	
	B	La myasthénie	
	C	L'insuffisance rénale	
	D	L'insuffisance hépatique	
	E	La sclérose en plaque	
59	តើកំរិតថ្នាំRIFAMPICINEលើអ្នកជំងឺរបេងម្នាក់មានទំងន់60 kg ប្រើតាមចម្លើយណាមួយ ?		
	A	150 mg/j en une prise(ប្រើតែម្តង)	
	B	600 mg/j en deux prises orales(លេប២ដង)	
	C	1200 en deux prises orales par semaine(លេប២ដងក្នុង១អាទិត្យ)	
	D	1200 mg/j en une seule prise orale matinale à jeun (លេបតែម្តងគត់ពេលព្រឹកមុនអាហារ)	
	E	600 mg/j en une prise orale matinale à jeun (លេបតែម្តងពេលព្រឹកមុនអាហារ)	
60	ការគៀបសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងររយៈពេលយូរ(compression sévère et chronique ) du nerf médian du canal carpien ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយ :		

	A	ស្វិត(atrophie) 1er espace interosseux	
	B	ស្វិត(atrophie) éminence thénar	
	C	ស្វិត(atrophie)éminence hypothénar	
	D	ស្វិត(atrophie) muscle extenseur propre du pouce	
	E	ស្វិត(atrophie) muscle abducteur du cinquième	
61	តើថ្នាំមួយណាក្នុងចំណោមថ្នាំលាប(topiques)ខាងក្រោមនេះ យកទៅព្យាបាលកមរមាស (gale humaine )		
	A	KétodermR (Ketoconazole)	
	B	AphtiriaR (Lindane)	
	C	PevarylR (Econazole)	
	D	BetnevalR (Betamethasone)	
	E	AscabiolR (Benzoate de benzyle)	
62	Le bloc auriculo-ventriculaire complet ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយ:		
	A	Un raccourcissement de l'espace PR	
	B	Un allongement progressif de l'espace PR	
	C	Un allongement de QRS	
	D	Des ondes P et des complexes QRS dissociés	
	E	Une tachycardie à 120/min	
63	តើលក្ខណៈចាំបាច់ណាមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការព្យាបាលជាតិដែក (martial) ក្នុងករណីអ្នកជំងឺខ្វះគ្រាប់ឈាមដោយខ្វះជាតិដែក(anémie par carence en fer) គឺ:		
	A	កម្រិត hémoglobine មកធម្មតាបន្ទាប់ពីព្យាបាលបាន១ខែ	
	B	រាប់គ្រាប់ឈាម(hémogramme) ឃើញចំនួនគ្រាប់ឈាមក្រហមធម្មតា (hématies normal)	
	C	ជាតិដែកក្នុងឈាមធម្មតា(fer sérique normal)	
	D	សារធាតុផ្ទុកជាតិដែកក្នុងឈាមធម្មតា(ferritinémie normale)	
	E	Un volume globulaire moyen normal (VGM)	
64	តើ prednisolone (Solupred*) មានលក្ខណៈសម្បត្តិ (caractéristique)ណាមួយខាងក្រោមនេះ:		
	A	គ្មានឥទ្ធិពលទប់ស្កាត់ axe hypothalamo-hypophysaire	



	B	គ្មានឥទ្ធិពលទប់ស្កាត់ minéralo-corticoïde	
	C	វាមិនបណ្តាលអោយមានផលវិបាក(deffets indésirables) លើក្រពះទេ	
	D	បំលែងធាតុមួយផ្នែកជា prednisone នៅក្នុងខ្លួន	
	E	ភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយ protéique spécifique បន្ទាប់មកភ្លាយខ្លួនជា transcortine plasmatique	
65		វិបត្តិកំណកឈាម(coagulation plasmatique)យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការហូរឈាម (hémorragiques) ដូចតទៅនេះ លើកលែងតែ មួយ គឺអ្វី ?	
	A	Hémarthroses	
	B	Purpura pétéchiial	
	C	Hématomes intramusculaires	
	D	Hématomes du plancher de la bouche	
	E	Hématuries	
66		QUESTION N° 4 [S] តាមលក្ខណវេគសញ្ញាដូចតទៅនេះ តើវេគសញ្ញាណាមួយបង្ហាញពី dyspnée laryngée ?	
	A	Bradypnée inspiratoire	
	B	Bradypnée expiratoire	
	C	Dyspnée aux 2 temps respiratoires	
	D	Cyanose sans tirage	
	E	Polypnée rapide	
67		QUESTION N° 6 [S] តើកត្តាណាមួយខាងក្រោមនេះ ដែលបង្កឱ្យមានការរំញោចបេះដូង(hyper excitabilité cardiaque ) ពេលប្រើពូក digoxine?	
	A	Une hypernatrémie	
	B	Une hypocalcémie	
	C	Une hypermagnésémie	
	D	Une hyperglycémie	
	E	Une hypokaliémie	
68		តើអាំងឌីកាទ័រណាមួយខាងក្រោមត្រឹមត្រូវសម្រាប់វាស់ឱ្យដឹងពីប្រសិទ្ធភាព១ឆ្នាំដំបូង នៃvaccin contre l'hépatite B ?	
	A	De mortalité	

	B	De létalité	
	C	De prévalence de période	
	D	D'incidence	
	E	De prévalence instantanée	
69	QUESTION N° 8 [S] ការលេចឡើងភ្លាមៗនូវ diplopie binoculaire ក្មេងជំទង់ ដោយគ្មានប្រវត្តិជម្ងឺភ្នែក ត្រូវតែគិតដល់ ?		
	A	Une cataracte	
	B	Un décollement de rétine	
	C	Une rétinopathie diabétique	
	D	Une paralysie oculo-motrice	
	E	Une oblitération de l'artère centrale de la rétine	
70	QUESTION N° 10 [S] បុរសម្នាក់អាយុ ៤៥ឆ្នាំ គ្មានប្រវត្តិជម្ងឺពីមុនមក ភ្លាមៗនេះគាត់មានការឈឺចាប់នៅ flanc droit និង créatininémie à 700 micromol/l. យើងស្ថាប័នពោះមានអារម្មណ៍ថា តំរងនោមទាំងពីររីកធំ (gros reins) និងមានការឈឺចាប់នៅតំរងនោមខាងស្តាំ។ តើ ការពិនិត្យអមគ្លីនិកអ្វីសំរាប់ជួយធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ?		
	A	Echographie rénale	
	B	Scintigraphie rénale	
	C	Phlébographie rénale	
	D	Ponction biopsie rénale	
	E	Artériographie rénale	
71	QUESTION N° 14 [S] រោគសញ្ញា absences simples នៃជម្ងឺស្តន់ជ្រូក (épilepsies) ត្រូវបានគេពិនិត្យឃើញ:		
	A	ផ្នែកណាមួយដោយមិនដឹងមូលហេតុ (Partielles idiopathiques)	
	B	មានរោគសញ្ញាតែផ្នែកណាមួយ (Partielles symptomatiques)	
	C	គ្រប់ផ្នែកទាំងមូលដោយមិនដឹងមូលហេតុ (Généralisées idiopathiques)	
	D	មានរោគសញ្ញាគ្រប់ផ្នែកទាំងមូល (Généralisées symptomatiques)	

	E	គ្មានទំរង់ទាំងនេះ: (Aucune de ces formes)	
72		បណ្តាពេកសញ្ញាដូចតទៅនេះ វាចង្អុលបង្ហាញពី occlusion aiguë de l'artère centrale de la rétine	
	A	Douleur oculaire	
	B	Hémorragies rétiniennes diffuses	
	C	Oedème ischémique de la rétine	
	D	Atrophie papillaire	
	E	Oedème de stase papillaire	
73		QUESTION N° 16 [S] ក្នុងចំណោមការព្យាបាលខាងក្រោមនេះតើមួយណាដែលអ្នកជម្ងឺ extrasystoles ventriculaires (លើសពី៥ដងក្នុង១នាទី) នៅ១ម៉ោងដំបូងបន្ទាប់ពីមាន infarctus du myocarde ទទួលបានល្អជាងគេ ?	
	A	Digitaliques IV	
	B	Dopamine IV	
	C	Dérivés nitrés IV / Nitro derivatives	
	D	Entraînement électrosystolique	
	E	Lidocaïne IV	
74		QUESTION N° 17 [S] ក្មេងម្នាក់អាយុ៦ឆ្នាំមានដំណើរខួក (boiterie) តាំងពី១៥ថ្ងៃ ហើយគ្មានប្រវត្តិរមួល ឬរលាកឡើយ, លទ្ធផលនៃការថតឆ្អឹងត្រគាកចំពីមុខ និងចំហៀងឃើញធម្មតា។ តើការអោយដំបូន្មាន (conduite à tenir) យ៉ាងដូចម្តេច?	
	A	ត្រូវអះអាងដល់ក្រុមគ្រួសារថាមិនចាំបាច់មកតាមដានទៀតទេ	
	B	ត្រូវថត tomographie ចង្កេះ	
	C	ត្រូវថត arthrographie ចង្កេះ	
	D	ត្រូវអោយក្មេងនៅស្ងៀម និងថត scintigraphie	
	E	ត្រូវថតឆ្អឹងត្រគាកដោយកាំរស្មីអ៊ិច៦ខែក្រោយ	
75		តើពេកសញ្ញាណាដែលយើងមិនដែលជួបប្រទះសោះក្នុងករណី crise de glaucome aigu ដោយសារ fermeture de l'angle ?	
	A	Injection périkeratique	

	B	Hypertonie	
	C	Baisse de l'acuité visuelle	
	D	Myosis	
	E	Douleur	
76	<p>QUESTION N° 19 [S]</p> <p>គ្រប់ជម្ងឺ valvulopathies ដូចតទៅនេះអាចបណ្តាលអោយកើតជម្ងឺ insuffisance ventriculaire gauche លើកលែងតែមួយ តើអ្វី?</p>		
	A	Insuffisance	
	B	Rétrécissement	
	C	Insuffisance aortique	
	D	Maladie aortique	
	E	Rétrécissement mitral	
77	<p>ការព្យាបាលភ្នែកក្រហម(oeil rouge) តើថ្នាំបន្តក់ភ្នែក(collyre) ណាត្រូវគេហាមប្រើ ក្នុងករណីមិនបានពិនិត្យភ្នែកដោយ lampe à fente ?</p>		
	A	Antibiotique	
	B	Corticoïde	
	C	Cicatrisant	
	D	Désinfectant	
	E	Anesthésique	
78	<p>បុរសម្នាក់អាយុ ២០ឆ្នាំ លេចចេញនូវស្នាមរមាស់រ៉ាំរ៉ៃ(lésions prurigineuses chroniques) នៅផ្នត់ដៃ(plis des coudes) និងផ្នត់ជើង(creux poplités) ទាំងសងខាង។ បណ្តាពេទ្យសញ្ញាដូចតទៅនេះ មាន១ហាក់ដូចជាអោយសញ្ញាច្បាស់លាស់ បន្ទាប់ពីឃើញបានម្តង ។</p>		
	A	Une gale	
	B	Une dermatophytie	
	C	Un psoriasis des plis	
	D	Une infection bactérienne chronique	
	E	Une dermatite atopique	

79	QUESTION N° 22 [S] បណ្តាជំងឺ (affections)ខាងក្រោម មានមួយមិនដែលអោយទៅជា endocardite infectieuse ទាល់តែសោះ ?	
	A Insuffisance aortique	
	B Communication interauriculaire	
	C Communication interventriculaire	
	D Canal artériel	
	E Insuffisance mitrale organique	
80	អ្នកជម្ងឺម្នាក់អាយុ៥២ឆ្នាំ ធាត់ មានការឈឺចាប់ស្លឹកស្រពន់ ស្រយង់( engourdissement) ប្រអប់ជើងទាំងពីរជាប់តាំងពី៣ឆ្នាំមកហើយ និងបាត់បង់សម្បទានផ្លូវភេទតាំងពី១ឆ្នាំមុន។ វាមានលេចចេញនូវសញ្ញាដំបៅបាតជើងតូចៗមិនឈឺចាប់(maux perforants plantaires indolores)។ តើរោគវិនិច្ឆ័យខាងក្រោមណាមួយសមស្រប?	
	A សង្កត់លើmoelle dorsale (Compression médullaire dorsale)	
	B Sclérose en plaques	
	C Polymyosite	
	D Polynévrite diabétique	
	E Polyradiculonévrite chronique	
81	បណ្តាសំណើរខាងក្រោមនេះ ដែលទាក់ទងជាមួយ antigène prostatique spécifique(PSA) គឺមួយណាត្រឹមត្រូវ?	
	A អត្រាP.S.A. ក្នុងឈាមនៃស្រ្តីគឺចន្លោះពីentre 3ទៅ5 g/ml	
	B L'adénome prostatique n'augmente pas le taux sanguin de P.S.A.	
	C កំហាប់P.S.A. ឡើងខ្ពស់ខ្លាំងក្នុងles sécrétions prostatiques ជាងនៅក្នុងឈាមpériphérique	
	D Le P.S.A. ជា un marqueur spécifiqueនៃcancer de la prostate	
	E Les prostatites aiguës ធ្វើអោយចុះកំហាប់P.S.A. ក្នុង	
82	ក្នុងការបញ្ជាក់ពីផលនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ atropine មាន១ដែលត្រឹមត្រូវ តើអ្វី?	
	A វាទៅរំញោច récepteurs muscariniques	

	B	វាធ្វើអោយ sécrétion sudorale កើនឡើង	
	C	វាធ្វើអោយមាន mydriase	
	D	វាបន្ថយល្បឿន conduction auriculo-ventriculaire	
	E	វាធ្វើអោយមាន bronchoconstrictrice	
83	Le tamoxifène គឺជា:		
	A	Un androgène	
	B	Un agent alkylant	
	C	Un antiandrogène	
	D	Un anti-oestrogène	
	E	Un progestatif	
84	ក្មេងម្នាក់អាយុ៣ឆ្នាំ សុខភាពល្អ គ្មានប្រវត្តិជម្ងឺគួរអោយកត់សំគាល់។ កាលពីម៉ោង ១ យប់មិញវាមានសញ្ញាក្អក គឺជាក្អកមានសំលេងស្អក(toux estrauque) រួមជាមួយ ពិបាកដកដង្ហើមចូលតិចតួច, កំដៅ 38°C។ តើ រោគវិនិច្ឆ័យខាងក្រោម មួយណា សមស្រប?		
	A	Crise d'asthme	
	B	Corps étranger bronchique	
	C	Abcès de l'amygdale	
	D	Laryngite sous-glottique	
	E	Bronchite	
85	តើមូលហេតុដែលជួបញឹកញាប់ជាងគេនៃ trismus គឺអ្វី ?		
	A	Toxique	
	B	Tumorale	
	C	Tétanos	
	D	Infectieuse générale à germes anaerobies	
	E	Infectieuse locorégionale	
86	ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវតាម biologie នៃ anémie hémolytique auto-immune គឺ:		
	A	Le test de Coombs indirect à l'antiglobuline humaine	
	B	La recherche d'agglutinines irrégulières	

	C	Le test de Coombs direct	
	D	Le dosage des transaminases	
	E	L'hémogramme	
87	តើ lésion élémentaire នៃ stomatite herpétique គឺអ្វី ?		
	A	Papule	
	B	Erythème	
	C	Kératose	
	D	Bulle	
	E	Vésicule	
88	រលាកបង្ហូរនោម(uréthrites) ដោយពូកិ chlamydiae គឺ:		
	A	មិនក្រហាយនៅពេលនោម (Ne donnent pas de brûlures à la miction)	
	B	វាកើតមានបន្ទាប់ពីធ្វើ endoscopique (Se développent après exploration endoscopique)	
	C	វាមិនចម្លងតាមផ្លូវភេទទេ (N'ont pas de contamination vénérienne)	
	D	ត្រូវបានគេព្យាបាលជាមួយពូកិ cyclines (Sont sensibles aux cyclines)	
	E	វាមិនលាប់ឡើងវិញទេ (Ne récidivent pas)	
89	រោគសញ្ញាដំបូងនៃការពុល(intoxication) សារជាតិថ្នាំdigitalique ជាធម្មតាគឺ:		
	A	ចន្លោះ PR កើនឡើង (allongement de l'intervalle PR) នៅលើខ្សែ électrocardiogramme	
	B	វត្តមាន une cupule digitalique នៅលើខ្សែ électrocardiogramme	
	C	បង្ហាញផងដែរនូវ fibrillation auriculaire	
	D	វត្តមាន tachycardie	
	E	ការផុសឡើងនូវ troubles digestifs (anorexie, nausées)	
90	Une dysphonie មានន័យថាការថយចុះ (altération) នូវ: (ចូរគូសចំឡើយត្រឹមត្រូវមួយ)		
	A	La voix parlée	
	B	La voix chantée	
	C	De la compréhension du langage	
	D	De l'articulation du langage	

	E	De l'élaboration du langage	
91		ដើម្បីបញ្ជាក់ច្បាស់ក្នុងករណីខ្វះឈាមចិញ្ចឹមវេទីន (ischémie rétinienne) ក្នុងករណី rétinopathie អ្នកទឹកនោមផ្អែមត្រូវបានគេធ្វើដោយ:	
	A	L'examen à la lampe	
	B	L'examen du fond d'oeil en ophtalmoscopie directe	
	C	La mesure de la pression intraoculaire	
	D	L'examen échographique	
	E	L'angiographie fluorescéinique du fond d'oeil	
92		ក្នុងចំណោមសុំណើរខាងក្រោមនេះគឺទាក់ទងនឹង syndrome de Gilbert ទាំងអស់ សុទ្ធតែត្រឹមត្រូវ លើកលែងតែ១ តើអ្វី ?	
	A	ការចេញល្បឿងរួមជាមួយទឹកនោមពណ៌ថ្លា (L'ictère s'accompagne d'urines claires)	
	B	ការចេញល្បឿងថយចុះនៅពេលព្រលឹម (Le jeûne diminue l'ictère).	
	C	ការចេញល្បឿងដោយសារ bilirubine non conjuguée លើសពី 60 $\mu$ mol ដោយកម្រ(L'ictère dépasse rarement 60 $\mu$ mol de bilirubine non conjuguée).	
	D	ជោគវាសនាមិនធ្ងន់ធ្ងរ (Le pronostic est bénin).	
	E	ថ្នាំ phénobarbital កាត់បន្ថយបរិមាណ bilirubine libre.	
93		គ្រប់សុំណើរទាំងនេះបញ្ជាក់ពី complication de la micro-lithiasevésiculaireលើក លែងតែមួយ តើអ្វី?	
	A	Pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique	
	B	Septicémie à germes Gram négatifs	
	C	Ictère à bilirubine conjuguée	
	D	Iléus biliaire	
	E	Pyélonéphrite aiguë	
94		L'ostéomyélite នៅលើឆ្អឹងវែង(os long) របស់ក្មេងជាទូទៅកើតលើឆ្អឹង:	
	A	La diaphyse	
	B	La métaphyse	
	C	Le cartilage de croissance	



	D	L'épiphyse	
	E	Le cartilage articulaire	
95	តើមានសញ្ញាអ្វីបង្ហាញពីការពេញវ័យដំបូង (début de la puberté) របស់ក្មេងស្រី ?		
	A	ការលេចឡើងនៃរដូវលើកដំបូង(Apparition des premières règles)	
	B	ការប្រែប្រួលសរីរាងកាយខាងក្រៅ(Modification des organes génitaux externes)	
	C	ការឡើងដោះ:(Développement des seins)	
	D	ការលេចឡើងនៃរោមឆ្មារៗលើស្បែក (Apparition d'une pilosité pubienne abondante)	
	E	ការចម្រើនវ័យលឿន (Poussée de croissance)	
96	ចូរបង្ហាញពីកន្លែងដែល cancers colo-rectaux កើតឡើងញាប់ជាងគេ:		
	A	Le recto-sigmoïde	
	B	Le colon gauche	
	C	Le transverse	
	D	Le colon droit	
	E	Le caecum	
97	តើការព្យាបាលដោយប្រញាប់(urgence)លើអ្នកជម្ងឺពុលពូក អ៊ុកស៊ីតដីកាប៊ូន (CO) ភ្លាមៗ យ៉ាងដូចម្តេច?		
	A	Epuration extrarénale	
	B	Corticoïdes injectables	
	C	Bleu de méthylène en intraveineux	
	D	Oxygénothérapie	
	E	Digoxine	
98	បណ្តាសំណើខាងក្រោមនេះមាន១មិនត្រឹមត្រូវ តើអ្វី?		
	A	រលាកដោយកំដៅជួបប្រទះញឹកញាប់ (Les brûlures thermiques sont les plus fréquentes)	
	B	រលាកដោយសារចរន្តអគិសនីជានិច្ចកាលសើរៗ(Les brûlures électriques sont toujours superficielles)	

	C	រលាកដោយសារចរន្តឆ្លាស់គឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង(Les brûlures par courant alternatif sont les plus graves)	
	D	ពួកអាស៊ីតដែលអោយរលាកធ្វើអោយមានកំណកprotéines (Les acides brûlent en coagulant les protéines)	
	E	ពួកសារធាតុ photosensibilisants ជួយអោយងាយរលាកដោយ radiations (Les agents photosensibilisants favorisent les brûlures par radiations)	
99	ការព្យាបាលជម្ងឺឈ្មោះ légionnaires ជាទូទៅគេប្រើថ្នាំផ្សេងៗពួក៖		
	A	Céphalosporine	
	B	Ampicilline	
	C	Bactrim	
	D	Aminoside	
	E	Macrolide	
100	កូនង៉ាមានអាយុពី ៦ ទៅ ៨ខែ។ តើក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាខាងក្រោមនេះ ១ណាអ្នកគិតថាក្មេងនេះមានជម្ងឺ ?		
	A	វាទន់ក (Il ne tient pas bien sa tête)	
	B	វាយំខ្លាំងចំឡែក (Il pleure en présence d'un étranger)	
	C	វាមិនចេះញ៉ាំអាហារដោយស្លាបព្រា (Il ne sait pas encore bien manger à la cuillère)	
	D	វាត្រាប់សំលេងតាមមនុស្សចាស់ (Il imite les sons émis par l'adulte)	
	E	ការចាប់កាន់របស់ជារបៀប digito-palmaire (La préhension des objets est digito-palmaire)	
101	បណ្តាអត្រា(taux) ៥ខាងក្រោមនេះ តើមួយណាតំណាងចំនួនមនុស្សមានជម្ងឺដែលទាក់ទង និងចំនួនមនុស្សយកមកអង្កេតជាក់លាក់មួយ(un instant donné)		
	A	Taux proportionnel de morbidité	
	B	Taux d'incidence	
	C	Taux de prévalence	
	D	Taux d'attaque	
	E	Taux de récurrence	

102	ជម្ងឺដូចតទៅនេះអាចធ្វើអោយជម្ងឺ polyarthrite rhumatoïde លាប់ឡើងវិញ លើក លែងតែ១ តើអ្វី ?		
	A	Fibrose pulmonaire interstitielle diffuse	
	B	Péricardite	
	C	Psoriasis cutané	
	D	Luxation atloïdo-axoïdienne	
	E	Nodules sous-cutanés	